

Czy można zapobiec zakażeniu paciorkowcem grupy B?

Pomimo badań przesiewowych i leczenia, u niektórych dzieci nadal może rozwinąć się zakażenie paciorkowcem grupy B. Celem badań przesiewowych i antybiotykoterapii jest zmniejszenie ryzyka dla dziecka, ale ryzyka nie da się wyeliminować całkowicie. Jeśli u dziecka rozwinie się infekcja paciorkowcem grupy B, to podczas pobytu w szpitalu dziecka można podać antybiotyki.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zakażenia paciorkowcem grupy B, proszę skonsultować się ze swoją położną lub lekarzem podczas kolejnej wizyty.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na witrynę internetową

www.rotunda.ie

www.HSE.iewww.gbss.org.uk

Zakażenie paciorkowcem grupy B w ciąży

Ulotka informacyjna




SZPITAL
ROTUNDA
w DUBLINIE

Wersja 1.0 24 lipca 2023 r

Co to jest paciorkowiec grupy B (Group B Streptococcus -GBS) ?

Paciorkowce grupy B to powszechne występujące bakterie na przykład w pochwie, moczu lub odbytnicy (przeście tylna). Zwykle bakterie te nie są szkodliwe. Paciorkowce grupy B można jednak przekazać dziecku podczas porodu i wywołać w ten sposób zakażenie zagrażające życiu, w tym zatrucie krwi, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenie płuc.



Kto jest zagrożony?

U niektórych kobiet w ciąży zagrożenie zakażeniem dziecka paciorkowcem grupy B jest wyższe i dlatego, w razie potrzeby, kobietom tym oferuje się badania przesiewowe lub terapię antybiotykową podczas porodu.

Jesteś w grupie wysokiego ryzyka, jeśli:

- * wody odejdą na więcej niż 24 godziny przed urodzeniem dziecka
- * zaczynasz rodzić lub przedwcześnie odchodzą wody (przed 37 tygodniem)
- * masz podwyższoną temperaturę podczas porodu (ponad 38°C)
- * w obecnej ciąży masz pozytywny wynik testu na zakażenie paciorkowcem grupy B
- * zakazisz się podczas porodu
- * urodziłaś już dziecko z zakażeniem paciorkowcem grupy B

Badania przesiewowe w kierunku zakażenia paciorkowcem grupy B

Badania przesiewowe w kierunku zakażenia paciorkowcem grupy B nie oferuje się wszystkim kobietom w Irlandii. Podczas wizyty rejestracyjnej w szpitalu Rotunda, od wszystkich kobiet pobierana jest próbka moczu w celu wykonania badania w kierunku zakażenia paciorkowcem grupy B. Kobietom, które zgłaszają się w momencie odejścia wód (ale jeszcze nie rodzą) oraz kobietom, u których poród będzie wywołany, oferujemy badanie przesiewowe w kierunku zakażenia paciorkowcem grupy B. Kobietom uczulonym na penicylinę, między 35 a 37 tygodniem ciąży zaoferowane będzie badanie przesiewowe w kierunku zakażenia paciorkowcem grupy B, aby określić odpowiednią alternatywę dla penicyliny. W ramach wymazu pobiera się próbki komórek z pochwy i odbytnicy (przeście tylna). Próbki wysyłamy do laboratorium, gdzie będą poddane analizie.



Antybiotykoterapia przeciwko paciorkowcom grupy B

Kobietom, u których występuje zwiększone ryzyko przeniesienia zakażenia paciorkowcem grupy B na nowonarodzone dziecko, podczas porodu zaoferujemy antybiotyki podawane przez kroplówkę. Antybiotyki (zwykle penicylina) podaje się co 4 godziny od rozpoczęcia porodu aż do narodzin dziecka. Kobietom ze stwierdzonym uczuleniem na penicylinę zaoferujemy odpowiednią alternatywę.



Zakażenie paciorkowcem grupy B, jeśli wody odejdą przed porodem

Jeżeli odeszły Ci wody (po 37 tygodniu ciąży), ale jeszcze nie ma porodu, to po przybyciu do szpitala zalecamy wykonanie badania przesiewowego w kierunku zakażenia paciorkowcem grupy B. Możemy Cię wypisać do domu i zalecić oczekiwanie na wynik (do 6 godzin).

Jeśli wynik wymazu na obecność paciorkowca grupy B jest DODATNI

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i zalecimy powrót do szpitala.

Po powrocie zalecamy:

- * podawanie antybiotyków w kroplówce co 4 godziny do porodu, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia zakażenia paciorkowcem grupy B na dziecko
- * rozpoczęcie porodu (wywołanie porodu), ponieważ skróci to czas narażenia dziecka na zakażenie paciorkowcem grupy B przed urodzeniem

Jeśli wynik wymazu na obecność paciorkowca grupy B jest UJEMNY

Ponieważ ryzyko dla dziecka jest znacznie zmniejszone, zalecamy rozpoczęcie porodu (wywołanie porodu) w ciągu 24 godzin od odejścia wód.

Pracownicy szpitala skontaktują się z Tobą tylko wtedy, gdy wynik wymazu paciorkowcem grupy B będzie dodatni