

## تصوير الرحم (HSG)

يتم حقن الرحم بصبغة تُعرف بمادة التباين. ويتم أخذ عدة صور بالأشعة السينية أو ما يسمى بالتنظير التآلي لتتبع الصبغة. والهدف من هذا التصوير توضيح ودراسة ما إذا كان الشكل الداخلي للرحم طبيعي أم غير طبيعي ، وإذا كانت قنوات فعندما . فالوب مفتوحة أو متضيقة أو مسدودة تماما يمتلئ الرحم وقناتي فالوب بمحلول التباين (صبغة)، يكون أخصائي الأشعة قادرًا على تصور وتقييم تشريح ووظيفة الرحم.

## لماذا يتم اللجوء إلى فحص الرحم HSG ؟

يستخدم فحص HSG بشكل أساسي عند النساء اللواتي يواجهن صعوبة في الإنجاب ، مما يسمح لأخصائي الأشعة بتقييم شكل الرحم وبنيته، ومدى صلاحية قناتي فالوب أو إمكانية وجود أي تندب في الأنايب أو الرحم.

كما يمكن استخدام الإجراء للتحقق من سبب الإجهاض المتكرر الناجم عن تشوهات الرحم الخلقية وتحديد وجود وشدة هذه التشوهات الرحمية، بما في ذلك:

- ندوب في الرحم
  - الأورام الليفية الرحمية
- يمكن أيضًا استخدام فحص HSG لرصد التأثيرات على قناتي فالوب بعد التدخلات الجراحية، بما في ذلك:
- العكس الأنبوبي (لمنع الحمل)
  - إعادة تشغيل قناتي فالوب بعد خضوعها لعملية التعقيم
  - أو بعد الجراحة المترتبة عن مرض.

## كيف أستعد لهذا لإجراء ؟

لتأكيد عدم وجود حمل أثناء إجراء الاختبار، من الأفضل أن تخضعي للفحص في غضون 10 أيام من دورة النساء، بمجرد توقف الدورة الشهرية.

لا ينبغي أن تخضعي لهذا الإجراء إذا كنت مصابة بمرض التهابي نشط. وإذا كنت تعانين من عدوى مزمنة في الحوض أو مرض غير معالج ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فيجب عليك إبلاغ الطبيب أو أخصائي الأشعة في وقت الفحص.

كما يلزمك إبلاغ قسم الأشعة عن أي دواء تتناولينه وعن أي نوع من الحساسية تعانين منه، خاصة لمحلول التباين (الصبغة)؛ ومن الضروري أيضا إخبار المكلفين بالفحص بكل الأمراض أو الحالات الصحية الأخرى.

سيُطلب منك إزالة ملابسك من الخصر في الجزء السفلي من جسمك، بما في ذلك ملابسك الداخلية، وتعويضها بلباس خاص بالاختبار. وقد يُطلب منك أيضًا إزالة المجوهرات والنظارات وأي أشياء معدنية أو ملابس قد تسبب أي تداخل مع صور الأشعة السينية.

يجب على النساء المقبلات على هذا الإجراء إبلاغ الطبيب أو مصور الأشعة عن أي احتمال لحملهن.

يتم إجراء هذا الفحص بشكل عام في العيادات الخارجية. ليس من الضروري أن يكون الشخص صائمًا قبل الإجراء.

## قسم الأشعة السينية

### لأخذ المواعيد:

اتصل أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى قسم الأشعة السينية خلال  
اليوم الأول من الدورة الشهرية

### للاتصال:

قسم الأشعة، مستشفى روتوندا

01 - 8171741

[hsg@rotunda.ie](mailto:hsg@rotunda.ie)

الاثنين - الثلاثاء 21:00 - 16:00 الأربعاء - الجمعة 21:00 -  
13:00

### المخاطر المحتملة:

العدوى، النزيف، ورد الفعل التحسسي.

### محدودية تصوير الرحم:

لا يُمكن هذا الفحص إلا من تصوير داخل الرحم  
وقناتي فالوب. ويمكن تحليل تشوهات المبايض  
وجدار الرحم وهياكل الحوض الأخرى عن طريق  
التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق  
الصوتية أو تنظير البطن.

### ما بعد الفحص:

من المحتمل أن تشعرى بعد الفحص بالألم و/أو  
التشنج لبضع ساعات. يرجى تناول مسكن في المنزل،  
مثل الباراسيتامول أو سولبادين إذا لم تكن لديك  
حساسية اتجاهها. أما في حالة الألم الشديد أو ارتفاع  
درجة الحرارة في غضون 7 أيام، فعليك الاتصال  
بقسم الطوارئ في مستشفى روتوندا على الرقم  
الهاتفي 01 8171700. ومن المتوقع كذلك حصول  
إفرازات مهبلية في الأيام القليلة الموالية، لكن حاولي  
أن لا تستخدمى السدادات القطنية. ومن المستحب  
الامتناع عن أي اتصال جنسي لمدة يوم أو يومين بعد  
إجراء التصوير الإشعاعي.

### كيف تسير عملية الفحص ؟

يتم وضع المريضة على ظهرها على طاولة الاختبار،  
الركبتين إلى الصدر. ثم يتم إدخال المنظار في عنق  
الرحم.  
ثم يبدأ محللول التباين (الصبغة) في ملء تجويف الرحم  
من خلال القنية حيث يقوم بالتقاط الصور بالمنظار.  
عندما يكتمل الإجراء، تتم إزالة القنية والسماح للمريض  
بالجلوس.

### ما الذي سأشعر به أثناء الفحص وبعده ؟

لا يسبب عموماً هذا الفحص سوى بعض الانزعاج  
المحدود. وقد تعاني بعض النساء من آلام حادة، مماثلة  
لتلك المرتبطة بالدورة الشهرية، والتي تختفي بعد بضع  
دقائق. قد يحدث انزعاج طفيف عند وضع القنية وحقن  
محللول التباين (صبغة) ، لكن هذا لا ينبغي أن يطول. قد  
يكون هناك أيضًا تهيج طفيف في تجويف البطن، مما  
يسبب ألمًا في أسفل البطن، ولكن لا يجب أن يستمر  
لفترة أطول.